

**TABLA DE APLICACIÓN  
COMPUESTO DE AMINOÁCIDOS 80%**

<p><b>CULTIVOS DE HORTALIZAS</b></p> <p>Tomate, pepino, cebolla, chile, papa, calabaza, brócoli, lechuga, espinaca, zanahoria, col, acelga, chayote, betabel, melón, sandía, entre otros.</p>	<p><b>APLICACIONES FOLIARES (1 - 5 g/L)</b> <b>APLICACIÓN EN RIEGO O DRENCH (0.5 - 2.5 kg/ha)</b></p>			
	<p><b>Primera</b></p> <p>De 2 a 3 semanas después de la germinación / Etapa post trasplante/ Etapa de desarrollo vegetativo.</p>	<p><b>Segunda</b></p> <p>Etapa de desarrollo vegetativo / Prefloración.</p>	<p><b>Tercera</b></p> <p>Formación de frutos/ Amarre o llenado de fruto.</p>	<p><b>Opcional</b></p> <p>En cultivos afectados por situaciones de estrés biótico o abiótico / Después del corte de frutos.</p>
<p><b>CULTIVOS FRUTALES</b></p> <p>Cítricos, aguacate, mango, manzana, durazno, papaya, carambola, granada, cafetal, higuera, guayaba, pitahaya, pera, plátano, entre otros. <b>Cultivo de vid.</b></p>	<p><b>APLICACIONES FOLIARES (3 - 6 g/L)</b> <b>APLICACIÓN EN RIEGO O DRENCH (1 -3 kg/ha)</b> <b>INTERVALOS DE 2 A 3 SEMANAS POR APLICACIÓN</b></p>			
	<p><b>Primera</b></p> <p>Después de la poda / Después del periodo de dormancia.</p>	<p><b>Segunda</b></p> <p>Brote de hojas/ Desarrollo vegetativo /Floración temprana.</p>	<p><b>Tercera</b></p> <p>Formación de frutos / Cuajado de frutos.</p>	<p><b>Opcional</b></p> <p>De 2 a 3 semanas después de la última aplicación / Después del raleo de frutos / Cuando el cultivo fue afectado por estrés por factores climáticos o hídricos.</p>
<p><b>CULTIVOS ORNAMENTALES</b></p> <p>Rosa, gerbera, crisantemo, lirio, gardenia, plantas de interior, violetas, girasol, tulipán, gladiolas, nochebuena, entre otros.</p>	<p><b>APLICACIONES FOLIARES (1 - 5 g/L)</b> <b>APLICACIÓN EN RIEGO O DRENCH (0.5 - 2 kg/ha)</b> <b>INTERVALOS DE 1 A 3 SEMANAS POR APLICACIÓN</b></p>			
	<p><b>Primera</b></p> <p>En caso de iniciar con el cultivo después del trasplante / Después del despunte.</p>	<p><b>Segunda</b></p> <p>Desarrollo vegetativo / Formación de botones.</p>	<p><b>Tercera</b></p> <p>Desarrollo vegetativo / Desarrollo de flores.</p>	<p><b>Opcional</b></p> <p>De 1 a 2 semanas después del corte para fortalecer el cultivo / Aplicar si la planta tuvo condiciones de estrés.</p>
<p><b>FRUTOS DEL BOSQUE</b></p> <p>Fresa, arándano, mora, frambuesa, zarzamora, grosella, entre otros.</p>	<p><b>APLICACIONES FOLIARES (1 - 3 g/L)</b> <b>APLICACIÓN EN RIEGO O DRENCH (0.5 - 1.5 kg/ha)</b> <b>INTERVALOS DE 1 A 3 SEMANAS POR APLICACIÓN</b></p>			
	<p><b>Primera</b></p> <p>Fortalecer el cultivo después del corte/ Después de poda/ Trasplante / Desarrollo vegetativo.</p>	<p><b>Segunda</b></p> <p>Desarrollo vegetativo / Prefloración.</p>	<p><b>Tercera</b></p> <p>Formación de frutos / Llenado de frutos.</p>	<p><b>Opcional</b></p> <p>Precosecha / Después de corte para estimulación de frutos en desarrollo.</p>