

**TABLA DE APLICACIÓN  
EXTRACTO DE ALGAS MARINAS**

**ALGAS MARINAS**

<p align="center"><b>CULTIVOS DE HORTALIZAS</b></p> <p>Tomate, chile, brócoli, calabaza, cebolla, betabel, papa, zanahoria, calabaza, lechuga, acelga, espinaca, etc.</p>	<p align="center"><b>APLICACIONES FOLIARES (1 - 5 g/L)</b> <b>APLICACIÓN EN RIEGO O DRENCH (0.5 - 2.5 kg/ha)</b> <b>INTERVALOS DE 1 A 2 SEMANAS POR APLICACIÓN</b></p>			
	<p align="center"><b>Primera</b></p>	<p align="center"><b>Segunda</b></p>	<p align="center"><b>Tercera</b></p>	<p align="center"><b>Opcional</b></p>
	<p>De 2 a 3 semanas después de la germinación / Etapa post trasplante/ Etapa de desarrollo vegetativo</p>	<p>Etapa de desarrollo vegetativo / Prefloración.</p>	<p>Formación de frutos/ Amarre o llenado de fruto.</p>	<p>En cultivos afectados por situaciones de estrés biótico o abiótico / De 1 a 2 semanas.</p>
<p align="center"><b>CULTIVOS FRUTALES</b></p> <p>Naranja, limón, aguacate, higuera, mango, manzano, durazno, guayaba, ciruela, mandarina, granada, toronja, nogal entre otros. <b>Cultivo de vid.</b></p>	<p align="center"><b>APLICACIONES FOLIARES (3 - 6 g/L)</b> <b>APLICACIÓN EN RIEGO O DRENCH (1 - 3 kg/ha)</b> <b>INTERVALOS DE 2 A 3 SEMANAS POR APLICACIÓN</b></p>			
	<p align="center"><b>Primera</b></p>	<p align="center"><b>Segunda</b></p>	<p align="center"><b>Tercera</b></p>	<p align="center"><b>Opcional</b></p>
	<p>Después de la poda / Después de la dormancia.</p>	<p>1-2 semanas después de la emergencia de hojas / Floración temprana.</p>	<p>Formación o cuajado de frutos.</p>	<p>De 2 a 3 semanas / Después del raleo de frutos / Cuando el cultivo fue afectado por estrés por factores climáticos o hídricos.</p>
<p align="center"><b>CULTIVOS ORNAMENTALES</b></p> <p>Rosa, tulipán, gerbera, lili, crisantemo, gladiola, gardenia, etc.</p>	<p align="center"><b>APLICACIONES FOLIARES (1 - 5 g/L)</b> <b>APLICACIÓN EN RIEGO O DRENCH (0.5 - 2 kg/ha)</b> <b>INTERVALOS DE 2 A 3 SEMANAS POR APLICACIÓN</b></p>			
	<p align="center"><b>Primera</b></p>	<p align="center"><b>Segunda</b></p>	<p align="center"><b>Tercera</b></p>	<p align="center"><b>Opcional</b></p>
	<p>En caso de iniciar con el cultivo después del trasplante / Después del despunte.</p>	<p>Desarrollo vegetativo / Formación de botones.</p>	<p>Desarrollo vegetativo / Desarrollo de flores.</p>	<p>De 1 a 2 semanas después del corte para fortalecer el cultivo / Aplicar si la planta presenta condiciones de estrés.</p>
<p align="center"><b>FRUTOS DEL BOSQUE</b></p> <p>Fresa, arándano, mora, frambuesa, zarzamora, grosella, entre otros.</p>	<p align="center"><b>APLICACIONES FOLIARES (1 - 3 g/L)</b> <b>APLICACIÓN EN RIEGO O DRENCH (0.5 - 1.5 kg/ha)</b> <b>INTERVALOS DE 1 A 3 SEMANAS POR APLICACIÓN</b></p>			
	<p align="center"><b>Primera</b></p>	<p align="center"><b>Segunda</b></p>	<p align="center"><b>Tercera</b></p>	<p align="center"><b>Opcional</b></p>
	<p>Fortalecer la planta después del corte/ Después de poda/ Trasplante / Desarrollo vegetativo.</p>	<p>Desarrollo vegetativo / Prefloración.</p>	<p>Formación de frutos / Llenado de frutos.</p>	<p>Precosecha / En época de corte para estimulación de frutos en crecimiento.</p>

\* La tabla de aplicación es una sugerencia de uso, es responsabilidad del empleador determinar las dosis adecuadas del producto de acuerdo con su forma de aplicación en campo o formulación.